

Patientinformation om brystreduktion og brystløft

Kvinder med fysiske og kosmetiske gener på grund af store og/eller hængende bryster kan hjælpes med en operation, hvor brysterne reduceres i størrelse og løftes.

KONSULTATIONEN

Du vil ved første konsultation på Privathospitalet Mølholm blive undersøgt og få rådgivning samt vejledning med hensyn til operation og efterforløbet af speciallæge i plastikkirurgi.

Inden første konsultation vil vi anbefale dig at bruge bagsiden af denne skrivelse til at notere eventuelle spørgsmål, så du husker at stille dem ved konsultationen, hvor informationen vil blive uddybet.

Du er velkommen til at tage en ven eller et familiemedlem med til konsultationen.

Der vil blive taget foto.

Du kan tidligst blive opereret en uge efter den første konsultation, da du skal have tid til at tænke tingene godt igennem, inden du beslutter dig for operation. Når du har besluttet dig, planlægges det videre forløb individuelt.

Ved den oftest anvendte metode fjernes kirtel- og fedtvæv i den nederste del af brystet, hvorefter brystvorten flyttes højere op og der dannes et ankerformet ar, det vil sige rundt om brystvorten, et lodret ned mod fugen under brystet og et vandret i fugen under brystet. Hvis der kun er behov for et lille løft eller lille reduktion, kan man i stedet fjerne et område omkring brystvorten og derved begrænse mængden af ar.

Da man under operationen gennemskærer en del udførselsgange fra mælkekirtlerne, kan evnen til at amme et barn blive nedsat som følge af operationen.

Med den teknik vi anvender, er problemet ikke så stort, som det har været tidligere, men vi anbefaler alligevel, at du overvejer at udsætte operationen, til at du har fået de børn, du ønsker. Vi anbefaler mammografi til kvinder over 30 år for at sikre, at der ikke er tilstande i brystet, som skal undersøges nærmere inden operation.

INDEN OPERATIONEN

Du må **IKKE** indtage Kodimagnyl, Magnyl, Treo eller andet blodfortyndende medicin 3 uger før operationen/1 uge efter operationen.

Gigtmedicin må ikke tages 3 uger før operation, men må anvendes som smertestillende efter operationen.

Hvis du får blodfortyndende medicin, bør nedtrapningen foretages i samråd med lægen. Dette gælder også for **NATURMEDICIN**, eksempelvis Q10, fiskeolie, hvidløbspiller etc.

Det tilrådes at undlade rygning 3 uger før operationen og 2 uger efter. Dette for at sikre bedst mulig blodtilførsel til det opererede område og det pæneste resultat efter operation.

Hvis du er syg, og her menes både influenza, forkølelse og forskellige former for betændelsestilstande, er det meget vigtigt, at du ringer til klinikken for at forhøre dig om, hvordan du skal forholde dig. Grunden er, at immunforsvaret ikke er i orden efter infektiøse tilstande, og da det drejer sig om en planlagt operation, er det vigtigt at minimere faktorer, der kan have indflydelse på det endelige resultat og ikke sætte dit helbred på spil.

OPERATIONEN

På operationsdagen skal du faste 6 timer før mødetidspunktet.

Du må således hverken ryge, drikke eller spise, dog må du gerne drikke vand og saft indtil 2 timer før operationen.

Du modtages på sengeafdelingen, hvor der vil være omklædning, tilsyn ved narkoselæge og tegning ved speciallægen.

Selve operationen foregår i fuld bedøvelse og varer ca. 1½ time. Efter operation bliver du observeret af en sygeplejerske og smertebehandlet.

Du kan udskrives fra sengeafdelingen efter ca. 6-8 timer, evt. overnatning efter lægelig vurdering. Det er nødvendigt, at du har nogen til at hente dig og være hos dig det første døgn.

EFTERKONTROL

Vi vil gerne se dig til kontrol ½ år efter operationen, ring venligst til sekretæren ca. 1 måned før og aftal tid.

Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål/problemer.

EFTERFORLØBET

Smerter: Der vil være ømhed i brystmuskulaturen og også smerter, hvilket er naturligt. Smerterne vil aftage gradvis i løbet af den første uge.

Du bliver smertebehandlet på sengeafdelingen og får smertestillende medicin med hjem. Af smertestillende medicin kan det være nødvendigt med morfinpræparater i starten kombineret med Panodil og Ibumetin.

Plaster: Operationsarret er tapet til med plaster, og der er således ingen udvendige tråde at fjerne. Plastre skal lades urørt i 12 dage, hvorefter det kan skiftes. For at opnå pæne ar anvendes plastre i 2-3 måneder. Du får udleveret plastre ved udskrivelsen.

BH: I stedet for forbindelse får du en sports-bh på, som skal anvendes de første 4 uger, de første 2 uger både dag og nat, de efterfølgende 2 uger kun i dagtiden.

Bad: Du må tage brusebad efter 3-4 dage. Plastret tørres grundigt, anvend evt. føntorrer.

KOMPLIKATIONER EFTER OPERATIONEN:

Blødning:

Et hæmatom er en ansamling af blod i det opererede væv. Det kan forårsage hævelse, smerte og dannelse af blå mærker.

Mindre hæmatomer absorberer kroppen selv uden problemer, men ved større hæmatomdannelse kan det være nødvendigt at re-operere. Risikoen for blødning er størst i den 1. uge efter operationen (1-2%).

Betændelse:

Der kan opstå infektion i forbindelse med enhver form for kirurgi (1-2%). De fleste infektioner efter kirurgi viser sig indenfor nogle få dage til uger efter operationen. Hvis der opstår rødme og usædvanlig ømhed omkring arret, kan dette være tegn på infektion.

Disse behandles med antibiotika. Sådanne komplikationer får sjældent betydning for slutresultatet.

Endelig kan der i sjældne tilfælde forekomme problemer med blodforsyningen til brystvorten, således at områder af denne dør. Disse komplikationer er overordentlig sjældne.

Føleforstyrrelser:

I en periode efter operationen kan følesansen i brystet være nedsat, men efter nogle måneder bliver følesansen oftest normal igen.

FORHOLDSREGLER:

Du bør holde dig i ro de første 2-3 uger efter operationen.

Du vil kunne påbegynde lettere arbejde efter 2-3 uger.

Efter 6 uger må du begynde på gymnastik, sport og svømmehal.

Tunge løft samt store skulder- og armbevægelser frarådes i 6 uger.

Du bør tillige undgå sollys/solarium på ar det første ½ år efter operationen.

INFORMATION om Dansk Plastikkirurgisk Mammaregister (DPM)

Man har fra Kræftens Bekæmpelses side oprettet et register, DPM, hvor man vil samle alle informationer om brystkirurgiske indgreb. Hvis du vil være med i undersøgelsen, som er frivillig, bedes du udfylde et skema og returnere det til DPM. Skemaet udleveres på operationsdagen.

Med venlig hilsen
Privathospitalet Mølholm A/S

Plastikkirurgisk Center
Slaven Boljanovic
Overlæge, speciallæge i plastikkirurgi

QI 06.252, rev. 01, Revideret august 2009, Næste revision august 2012