

Operation med nålemarkering af forandringer i brystet (Frank's nål)

Hvis der er indikation for fjernelse af en lille forandring i brystet, og forandringen ikke kan mærkes, anvendes en nålemarkering.

I forbindelse med mammografi eller ultralydsundersøgelse anbringer røntgenlægen i lokalbedøvelse en ganske tynd nål med en lille modhage placeret i forandringen i brystet. Denne markering foretages umiddelbart før operationen.

Ved operationen kan kirurgen således lade sig vejlede af nålens placering og sikre sig, at det rigtige område i brystet fjernes.

Forandringen i brystet kan være såkaldte mikroforkalkninger, der kan være udtryk for

forstadier til brystkræft eller anden forandring, hvor forstadier eller kræft ikke helt kan udelukkes.

Operationen sker i fuld bedøvelse, og du kan formentlig udskrives senere samme dag.

Vi anbefaler, at du den første måned efter operationen anvender en støttende sports-BH for at give såret ro til helingen. Vi anbefaler, at du medbringer en sports-BH ved indlæggelsen.

Der aftales svar på vævsprøven efter ca. 12 dage. Afhængig af resultatet kan yderligere operation komme på tale.

Med venlig hilsen

Privathospitalet Mølholt
Peter Wamberg
Overlæge,
Speciallæge i kirurgi

Rev.29. jan. 2010
QI 21.200-BRYST-03