

KARUDVIDELSER PÅ LÅR OG UNDERBEN

Større karudvidelser på lår og underben kan behandles med sklerosering (indsprøjtning af væske i under huden og ind i selve blodkarret, så dette lukker af). Specielt de blå karudvidelser er egnede til denne behandling. Finere, røde karudvidelser behandles bedst med laser.

Udviklingen af disse karudvidelser er arveligt betinget. Det udvikler sig ofte over flere år.

Selvom man behandler karudvidelserne med sklerosering, kan man ikke udelukke, at der kommer nye karudvidelser andre steder på underbenet år ud i fremtiden.

Procedure

Det er nødvendigt, at De kommer til en forundersøgelse hos speciallægen med henblik på vurdering af kredsløbet i benene. Man kan allerede ved forundersøgelsen starte skleroseringsbehandlingen.

Der skal gå ca. 4 uger mellem hver behandling, og det er oftest nødvendigt med 2-4 behandlinger afhængigt af, hvor udtalte karudvidelserne er.

Ved indsprøjtning af væsken vil huden hæve en smule og blive rød, men dette fortager sig i løbet af få dage.

De vil kunne køre hjem efter behandlingen, og under normale omstændigheder vil De kunne gå på arbejde dagen efter.

I forbindelse med behandlingen må De ikke tage solbad eller solarium de første par måneder efter behandlingen uden at anvende solcreme med mindst faktor 18, da det ellers kan medføre, at områderne bliver mørkere end den omgivende hudoverflade.

Pris

Se gældende priser på www.molholm.dk.

Med venlig hilsen
PRIVATHOSPITALET MØLHOLM A/S

Torben Vestersgaard-Andersen
Speciallæge i karkirurgi

QI 21.200-KAR-09, rev. 31.05.10