

Formålet med undersøgelsen

En gastroskopi, som foretages af en speciallæge, er en undersøgelse af spiserør og mavesæk, hvor man vha. et bøjeligt rør kan undersøge spiserør, mavesæk og tolvfingertarm. Man foretager en gastroskopi, hvis du gennem længere tid har haft symptomer som halsbrand, kvalme, opkastninger, ringe appetit, vægttab eller blodmangel.

Før undersøgelsen

For at speciallægen kan udføre en gastroskopi, er det nødvendigt, at din mavesæk er tom før undersøgelsen. Derfor må du ikke

- spise de sidste 6 timer før undersøgelsen
- drikke de sidste 2 timer før undersøgelsen

Får du insulin eller blodfortyndende medicin (Marcoumar eller Marevan), er det vigtigt, at du gør opmærksom på dette gerne allerede ved henvendelsen. Får du anden medicin, skal du tage den senest to timer før undersøgelsen.

Undersøgelsen

En gastroskopi foregår i lokalbedøvelse. For at få det smalle og bøjelige gastroskop gennem munden ned i

spiserøret, bliver du lokalbedøvet i munden med en spray. Det nedsætter opkastningstendensen. I sjældne tilfælde kan der også give afslappende medicin.

Gastroskopet føres ned i spiserøret, mavesækken og til sidst tolvfingertarmen. Med teknikken er det muligt at se slimhinderne efter. Speciallægen kan også tage små vævsprøver, hvis det skønnes nødvendigt. I forbindelse med undersøgelsen blæser man luft ned i mavesækken, hvilket kan udløse bøvse- og opkastningsreflekser. Undersøgelsen tager mellem 5-10 minutter.

Efter undersøgelsen

Umiddelbart efter undersøgelsen bliver du orienteret om undersøgelsesresultatet. Hvis der er foretaget vævsprøver, foreligger svaret først efter en uge. Resultatet modtager du pr post.

Det er vigtigt, at du ikke drikker eller spiser en time efter undersøgelsen. Har du fået afslappende medicin, må du ikke køre bil de første 6 timer efter undersøgelsen.

Risiko og komplikationer

Gastroskopi er en meget sikker undersøgelse, som yderst sjældent medfører komplikationer. Hvis du imidlertid efter hjemkomsten får mavesmerter eller blodige opkastninger, skal du tage kontakt til Privathospitalet Mølholm.