

## Restylane®

- En ikke permanent filler til udglatning af hudens rynker og furer



**Læber og furer:**  
*Før*

*Umiddelbart efter*



**Tåretrug:**  
*Før*

*To uger senere*

### Hvad er Restylane®?

Restylane® er et geléagtigt stof, bestående af hyaluronsyre, som naturligt findes overalt i vores bindevæv. Hyaluronsyre har en stor evne til at binde væske i huden og dermed give fylde. Hyaluronsyre bruges til at udfylde rynker og furer i ansigtet.

### Hvorfor injicere Restylane®?

Med alderen reduceres mængden af naturligt hyaluronsyre i huden, og huden bliver mere slap og tynd. Når Restylane® injiceres i folder og furer, udfyldes og gattes disse, og huden bliver mere spændstig. Geléen giver naturligt volumen i huden. Den integreres med det omgivende væv, og vitale næringsstoffer passerer frit igennem geléen. Der er en naturlig omsætning af hyaluronsyre i huden, og derfor aftager varigheden efterhånden.

### Hvordan foregår behandlingen?

Under behandlingen bliver den krystallklare gelé injiceret i huden i ganske små mængder med en helt tynd nål. Huden kan før behandlingen eventuelt lokalbedøves med en creme (EMLA). Det er også muligt at bedøve området omkring munden med en lokalbedøvelse (som hos tandlægen). Behandlingen varer ca. 30 minutter.

### Efter behandlingen

Umiddelbart efter behandlingen vil huden reagere på injektionen ved at være let til moderat hævet, rød og øm. Denne reaktion forsvinder løbende, typisk i løbet af et par dage. Læberne hæver forholdsvis meget, og derfor har de fleste ikke lyst til at gå på arbejde dagen efter behandling af læberne. Fire timer efter behandlingen må man igen anvende makeup.

### Efter behandlingen

Umiddelbart efter behandlingen vil huden reagere på injektionen ved at være let til moderat hævet, rød og øm. Denne reaktion forsvinder løbende, typisk i løbet af et par dage. Læberne hæver forholdsvis meget, og derfor har de fleste ikke lyst til at gå på arbejde dagen efter behandling af læberne. Fire timer efter behandlingen må man igen anvende makeup.

### Hvor længe holder behandlingen?

Det er meget individuelt, hvor lang tid behandlingen holder. Det afhænger af mange forskellige faktorer, for eksempel hudens struktur, hudens blodcirkulation, den ønskede perfektionsgrad samt den anvendte injektionsteknik. Erfaringen viser, at opfølgingsbehandlinger forlænger holdbarheden. Som oftest holder resultatet i læberne i ca. 4 til 6 måneder og i panden ca. ½ til 1 år.

### **Kan behandlingen gentages?**

Ja, behandlingen kan gentages, når det injicerede materiale i løbet af nogle måneder er blevet omdannet, eller hvis man ønsker resultatet finpudset eller forøget allerede efter f.eks. 14 dage. To uger efter første behandling har hyaluronsyren tilpasset sig i vævet, og på dette tidspunkt er det muligt at lægge mere hyaluronsyre ind oven på det først anlagte. Denne finpudsning øger holdbarheden og optimerer resultatet. Der er ikke nogen begrænsning på, hvor mange behandlinger man kan få.

### **Forventet resultat**

Resultatet er meget afhængigt af, hvor dyb rynken er, årsagen til rynken, hudens struktur og fasthed, beliggenheden af rynken, den anvendte mængde af stoffet samt injektionsteknikken. Derfor gennemgås det forventede resultat meget grundigt ved samtalen, inden behandlingen udføres.

### **Eventuelle bivirkninger og komplikationer**

*Der er risiko for følgende "Almindelige bivirkninger" (hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlinger):*

Efter enhver injektion er der risiko for blå mærker. Der kan være let rødme samt ømhed i området i et par dage efter injektionen..

Afhængig af injektionsteknikken og hudens anatomi kan der forekomme ujævnheder i deponeringen af filleren og eventuelt en overkorrigering af rynken. Dette svinder i takt med at filleren absorberes.

*Der er risiko for følgende "Ikke almindelige bivirkninger" (hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlinger):*

Der kan opstå rødme i huden, som kan vare i flere måneder

*Der er risiko for følgende "Sjældne bivirkninger" (hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlinger):*

Der er efter enhver injektion risiko for infektion.

Der er risiko for dannelse af granulomer (bindevævsknuder under og i selve huden).

### **Hvad er forskellen på de forskellige Restylane produkter**

De forskellige Restylane produkter: *Vital, Touch, Restylane, Lipp, Perlane og SubQ* adskiller sig fra hinanden ved gelépartiklernes størrelse. SubQ har de allerstørste partikler, og anvendes til udfyldning af hule kinder. Perlane har de næststørste partikler og egner sig bedst til dybere furer, f.eks. ved furen fra næsen til munden. Restylane har middelstore partikler, og er velegnet til rynker f.eks. ved munden og i panden. Restylane Lipp er udviklet specielt til at lave fylde af læberne, og har en konsistens mellem Perlane og Restylane .

Restylane Touch og Restylane Vital har de mindste gelépartikler, og anvendes til de fineste linier f.eks. ved øjnene samt til at give huden fugt i et større område f.eks. på kinder eller håndrygge.

### **Vi glæder os til at se dig**

Da det for nogle kan være rart at have en at dele oplevelsen med, er du velkommen til at medbringe en ven, veninde eller ægtefælle (bisidder) til konsultationen.

Med venlig hilsen

**PRIVATHOSPITALET MØLHOLT A/S**

Peter Bjerring,  
professor, dr. med.,  
speciallæge i hudsygdomme  
rev. sep. 2008  
(rev. næste gang sept. 2010)