

Sekretion eller blødning fra brystvorten

En del kvinder oplever på et tidspunkt, at der kommer lidt væske fra den ene eller begge brystvorter, også uden for ammeperioder. Væsken er hyppigt gullig, grønlig eller brunlig, og dette er i reglen et uskyldigt fænomen, hvis der ikke er andre fund eller symptomer.

Hvis væsken derimod er vandklar og kommer i rigelige mængder eller blodig, kan det være et faresignal, idet der kan være tale om brystkræft eller forstadier hertil. I disse tilfælde bør der gennemføres en grundig undersøgelse.

Lægen vil mærke brystet grundigt igennem, notere sig hvor på brystvorten, blødningen eller den vandige sekretion kommer fra, der vil blive gjort mammografi og ultralydsundersøgelse, og afhængig af disse fund kan man anbefale yderligere undersøgelse, eventuelt i form af en mindre operation.

Ved operationen kan der blive tale om fjernelse af en eller flere af de små mælkegange for at udelukke celleforandringer eller polypper i mælkegangen.

Operationen sker ambulantly i fuld bedøvelse. Det fjernede væv bliver undersøgt og afhængig af resultatet vurderer lægen, om der skal ske yderligere.

Vi anbefaler, at du den første måned efter operationen anvender en støttende sports-BH for at give såret ro til helingen. Vi anbefaler, at du medbringer en sports-BH ved indlæggelsen.

Der aftales svar på vævsprøven efter ca. 12 dage. Afhængig af resultatet kan yderligere operation komme på tale.

Med venlig hilsen
Privathospitalet Mølholm A/S

Peter Wamberg
Overlæge,
Speciallæge i kirurgi

Rev. 29. jan. 2010
QI 21.200-BRYST-09