

Patientinformation

Røntgenvejledt facetledsinjektion og nerverodsinjektion

Røntgenvejledt facetledsinjektion og nerverodsinjektion – hvad er formålet?

Ryggenes facetled eller nerverødder er ofte udgangspunkt for ryg- og bensmerter. Smerten kan ofte behandles med injektion af anti-inflammatorisk medicin i facetleddet eller ved nerverod. Injektionen foretages i lokalbedøvelse og under røntgen-gennemlysning.

Diagnostisk injektion: Bruges for at bevise hvorfra smerten opstår. Denne information bruges til at målrette et operativt indgreb optimalt og dermed gøre operationen så skånsom som mulig.

Terapeutisk injektion: Bruges for at give smertepatienten et "fri rum" uden smerter, så ryggen kan trænes og muskulaturen styrkes. Nogle patienter undgår derved operation. Ofte kan smertemedicin mindskes.

Gør det ondt?

Vi lægger meget vægt på, at behandlingen foregår med så få gener som muligt. Vi vil derfor altid give lokalbedøvelse omkring indstiksstedet.

Hvem udfører behandlingen?

Injektionerne udføres af Privathospitalets erfarne smertespecialister, som også er speciallæger i anæstesiologi (narkose).

Hvor lang tid tager behandlingen?

Behandlingsforløbet varer ca. ½ time, hvor selve injektionen vil vare under 15 min. Den øvrige tid bruges til samtale og information.

Hvordan udføres behandlingen?

Injektionen foregår mens du ligger på maven og med ryggen let krummet. Med røntgen gennemlysning finder speciallægen det helt korrekte sted for injektion som foretages med meget tynd kanyle. Naturligvis holdes området sterilt, og der vil blive lagt lokalbedøvelse.

Hvornår virker behandlingen?

Smertelindringen optræder oftest efter et par dage, kommer gradvist og holder sig i op til 8-12 uger. Enkelte har smertelindring, der allerede starter samtidig med behandlingen.

Efter undersøgelsen?

Injektionen vil i nogle tilfælde påvirke ens følelse i benene nogle timer efter injektionen. Du må derfor ikke føre motorkøretøj samme dag, og du skal derfor have en med, der kan køre for dig.

Smerteteamet følger op:

Smerteteamet vil følge din behandling, og vi vil derfor ringe til dig ca. 14 dage senere. Her vil den videre strategi blive planlagt.

Er der bivirkninger til undersøgelsen?

Vi har aldrig set tilfælde med infektion, blødning eller bivirkning til steroid-injektionen, og komplikationer er ekstremt sjældent forekommet i verdenslitteraturen.

Hvis du tager blodfortyndende medicin, så som for eksempel Maravan eller Marcoumar, bedes du oplyse det så hurtigt som muligt og altid før dagen hvor du skal behandles.

Andre navne til behandlingen:

I udlandet benævnes metoden som PeriRadikulær Terapie (PRT).

Med venlig hilsen
Privathospitalet Mølholt A/S

Smertespecialist
Speciallæge i anæstesiologi
Bent Uhrbrand

2008.10.07 Rev. 01