

Kegleoperation på livmoderhalsen

På grund af celleforandringer på livmoderhalsen fjernes et mindre kegleformet stykke (conus) af denne, som vist på tegningen.



Det lille indgreb foretages med elektrisk slynge i lokalbedøvelse – eventuelt i fuld bedøvelse og varer få minutter. Det fjernede område sendes til mikroskopisk undersøgelse, og svar fremkommer almindeligvis inden for en uges tid.

Indgrebet foretages ambulant. Hvis indgrebet skal foretages i fuld bedøvelse, er det nødvendigt at møde fastende, og man kan gå hjem efter nogle timers forløb med ledsager.

Foretages indgrebet i lokalbedøvelse, er det ikke nødvendigt at være fastende, og man kan gå hjem efter 1/2 - 1 time med ledsager.

Sygemelding er almindeligvis ikke nødvendig, men i den følgende uge bør hårdt arbejde herunder løb og lignende undgås. Når det meste udfald er ophørt efter 2-3 ugers forløb (kan være rigeligt og vandigt i starten), kan samliv genoptages.

Kontrolundersøgelse foreslås med passende mellemrum. Første gang efter ca. 3 måneder. Er der ingen celleforandringer efter 1 år foreslås årlig kontrol.

Råd og vejledning efter udskrivelsen

Hvordan skal jeg forholde mig, når jeg kommer hjem?

Du skal tage den med ro et par dage, men i øvrigt leve normalt og genoptage dine daglige gøremål.

De fleste vil være i stand til at passe deres arbejde dagen efter, men fysisk krævende arbejde, hård sport og tunge løft skal du vente en uges tid med.

Forholdsregler

Du kan have let blødning fra skeden i de første dage. Du skal også være forberedt på, at der kan komme lidt frisk blødning efter 8-10 dage. Dette skyldes, at sårskorpen i skedetoppen falder af.

Det er bedst at undgå samleje og karbad i denne periode pga infektionsrisiko. Du må gerne tage brusebad.

Kontrol

Du skal til en kontrol efter 3 måneder. Denne kan foregå her eller hos egen læge.

Svaret på mikroskopien får du skriftligt indenfor 1-2 uger.

Hvis der opstår problemer

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis der opstår problemer.

Hvis det bløder voldsomt, må du tage kontakt til Privathospitalet Mølholt eller vagtlægen.

Ligeledes skal du kontakte os, hvis du får tiltagende smerter eller hvis du får feber.

Med venlig hilsen
PRIVATHOSPITALET MØLHOLT A/S

Per Lundorff, klinikejer,
Overlæge, dr. med., speciallæge i
gynækologi og obstetrik

QI 21.200-GYN.04, rev. Juli 2010