

## Udskrabning af livmoderen

Udskrabning af livmoderen er et mindre indgreb, som foretages i lokalbedøvelse eller fuld bedøvelse.

Forud for udskrabningen vil det almindeligvis være nødvendigt med en forundersøgelse, som dog kan foretages på indlæggelsesdagen.

Ved forundersøgelsen vurderes livmoderen og æggestokkene for eventuelt at påvise årsagen til blødningsforstyrrelserne.

### Udskrabning i fuld bedøvelse

På indlæggelsesdagen møder man fastende, hvis udskrabningen skal foretages i fuld bedøvelse. Ved fuld bedøvelse sover man, mens indgrebet foretages.

### Udskrabning i lokal bedøvelse

I lokalbedøvelse foretages udskrabningen efter en lille bedøvelse på livmoderhalsen, og man behøver ikke at møde fastende. Indgrebet foregår ambulant.

I begge tilfælde varer indgrebet ca. 10 minutter. Man vil almindeligvis foretage udskrabning fra både livmoderhulen og livmoderhalsen.

Efter en kort observationsperiode, varende op til nogle få timer efter fuld bedøvelse, kan man tage hjem med en ledsager. Blødningen kan fortsætte i nogle få dage.

Mikroskopisvaret vil almindeligvis komme inden for 1-2 uger. Det vil blive sendt sammen med et resumé af indlæggelsen.

Kontrol eventuelt efter nærmere aftale.

Med venlig hilsen  
**PRIVATHOSPITALET MØLHOLM A/S**

Per Lundorff, klinikejer,  
overlæge, speciallæge i gynækologi og  
obstetrik

QI 21.200-GYN-11, rev. 30082010