

## CYSTOURETROSKOPI MED BIOPSI OG EVT. TUR-B

(kikkertundersøgelse med prøvetagning af væv i blæren og evt. fjernelse af en polyp)

På grund af at De har fået påvist polypper eller celleforandringer i blæren, skal De have foretaget en kikkertundersøgelse i fuld bedøvelse med fjernelse af eventuel polyp og prøvetagning af blæreslimhinden.

Får De tiltagende svie ved vandladningen og eventuelt feber, bør De få urinen undersøgt hos egen læge så hurtigt som muligt og få iværksat en behandling. Er De i tvivl, kan De altid kontakte Privathospitalet Mølholm.

### **Før operationen:**

De møder fastende på Privathospitalet Mølholm til det aftalte tidspunkt.

**Hvis De får hjertemagnyl eller anden blodfortyndende, er det vigtigt, at De har holdt pause med behandlingen i mindst 5 dage for at undgå unødvendig blødning.**

Med venlig hilsen

**Privathospitalet Mølholm A/S**

John Bugge Nielsen  
Speciallæge i urologi

QI 21.200-URO-16, rev. 1

### **Selve operationen:**

Under fuld bedøvelse indføres kikkerten i blæren, og eventuelle polypper skræbes væk. Har De fået påvist celleforandringer, tages der slimhindeprøver forskellige steder i blæren. Efter at eventuel blødning er standset, fjernes kikkerten, og der indlægges et midlertidigt blærekateter, som skal ligge, indtil urinen næsten er klar, hvorefter det kan fjernes.

### **Efter operationen:**

Efter at De har haft fri vandladning, kan De udskrives til videre behandling og kontrol afhængig af fundene ved undersøgelsen.

Efter en kikkertundersøgelse er der en lille risiko for blærebetændelse, og det er derfor vigtigt at drikke rigeligt de første par dage efter undersøgelsen.