

INFORMATION OM VANDBROK (HYDROCELE)

Vandbrok kan være en medfødt lidelse eller kan opstå senere i livet.

Ofte giver det gener i form af øget fylde i pungen. Der er sjældent smerter udover en vis spænding i området. Det er meget sjældent, at vandbrok forsvinder af sig selv igen, hvorfor man ofte må behandle med et operativt indgreb.

Mulighederne er:

1. Eventuelt tømning af væsken i vandbrokket og indsprøjtning af stoffet (Aethoxysklerol). Dette får vandbrokhinden til at skrumpes og kan foretages i lokal bedøvelse.

I en del tilfælde virker denne behandling imidlertid ikke, hvorfor man på Privathospitalet Mølholt oftest tilbyder kirurgisk fjernelse af hele vandbrokket, som forhindrer tilbagefald.

2. Kirurgisk behandling kræver fuld bedøvelse, hvorfor man møder fastende på det aftalte tidspunkt.

Før operationen:

Patienten bedes fjerne hårene på pungen og i lysken på den side, operationen skal foretages.

Efter operationen:

Patienten observeres i afdelingen i nogle timer. Efter fuld bedøvelse må man ikke selv køre hjem, og der skal derfor aftales hjemtransport eventuelt med pårørende.

De første par døgn efter operationen bør patienten holde sig i ro, da der er en lille risiko for blødning fra operationsstedet, hvis man er alt for fysisk aktiv. Trådene, som huden er lukket med, er selvopløselige, og forsvinder af sig selv.

Der kræves ikke kontrol, med mindre der er problemer.

Venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLT A/S

John Bugge Nielsen
Speciallæge i urologi

QI 21.200-URO-18, rev. 1