

## Behandling af årebrot (varicocele)

Årebrot/varicocele behandles på forskellig vis. På Privathospitalet Mølholt anvendes oftest den såkaldte skleroterapi. Dette er en lille operation, der foregår under fuld bedøvelse.

### Forberedelse

Man skal være fastende og må således ikke have indtaget fast føde inkl. mælkeprodukter indenfor de sidste 6 timer før operationen. Man må indtage tynde væsker (vand, saft etc.) indtil 2 timer før operationen. Al kønsbehåring skal fjernes før operationen.

### Selve operationen

Der laves et lille snit på siden af pungen, og testiklen tages ud. Man opsøger de udvidede blodårer (vener) langs sædstrengen og lægger en lille kanyle ind i én af disse. Der indsprøjtes kontrastmiddel for at fastslå, hvilken vej blodet løber op gennem bughulen. Herefter injiceres 2-4 ml af stoffet Aethoxysklerol, som får venerne til at klistre sammen. Denne procedure kan evt. gentages, indtil alle vener er tillukkede. Såret lukkes med tråde, der opløses af sig selv i løbet af nogle uger. Der skal således ikke fjernes tråde efter operationen.

### Efter operationen

Pungen kan være lidt hævet og øm i nogle dage. Der anbefales roligt regime med begrænsede aktiviteter 3-5 dage. Ingen sport i 2 uger. Det kan tage adskillige uger, inden hævelsen er helt væk, det skyldes, at årebrotket efter indgrebet indeholder koaguleret blod, som kun gradvist bliver nedbrudt. I enkelte tilfælde kan der opstå en blodsamling i pungen efter indgrebet, og det er kun yderst sjældent nødvendigt at operere for dette.

Venlig hilsen

### Privathospitalet Mølholt A/S

Hans Jørgen Kirkeby  
Speciallæge i urolog

QI 21.200-URO-21, rev. 1



PRIVATHOSPITALET  
MØLHOLM A/S

Privathospitalet Mølholm A/S  
Brummersvej 1 . DK-7100 Vejle . Tlf. +45 75 83 20 99 . Fax +45 75 83 53 50 . [www.molholm.dk](http://www.molholm.dk)  
A/S reg.nr. 203.771 . CVR-nr. 15645385