

Kirurgisk abort

Hvornår kan der udføres abort

Ifølge gældende dansk lovgivning kan der udføres provokeret abort før udgangen af 12. svangerskabsuge. Før 8. graviditetsuge kan aborten foregå enten som medicinsk abort eller ved en udskrabning/udsugning af livmoderhulen.

Mellem 8. og 12. uge foretages udelukkende udskrabning/udsugning af livmoderhulen.

Forundersøgelse

I forbindelse med forundersøgelsen foretages underlivsundersøgelse med ultralydsskanning til bestemmelse af graviditetslængden.

Abortmetoden aftales og der bliver orienteret om metoden.

Relevante formularer udfyldes, det videre forløb samt datoen for indgrebet fastlægges.

Kirurgisk abort/udskrabning

Ved indlæggelsen møder man fastende på sengeafdelingen, hvor man vil blive gjort klar til operation.

Udskrabningen foretages i fuld bedøvelse og varer ca. et kvarter. Hvis du ikke har født før, så vil du skulle have lagt blødgørende stikpiller op i skeden inden indgrebet. Det vil gøre udvidelsen af livmoderhalsen lettere og mere skånsomt.

Efter indgrebet

Der kan være menstruationslignende smerter og blødning efter indgrebet.

Udskrivelse foretages et par timer efter indgrebet. Vi anbefaler, at du har person med til at køre dig hjem.

Efter udskrivelsen kan der være behov for et par dages sygemelding.

Det er normalt, at du bløder lidt mere end ved normal menstruation i ca. 1 uge. Derefter vil det aftage, men du skal regne med at bløde i ca. 2 uger.

Det er vigtigt at undgå underlivsbetændelse ved

- at undgå samleje, så længe du bløder (eller bruge kondom),
- ikke at tage karbad, gå i svømmehal eller havbad, så længe du bløder,
- ikke bruge tamponer ved denne blødning.

Hvis du får kraftig blødning, stærkere smerter, ildelugtende udflåd eller feber, skal du kontakte Privathospitalet Mølholm, din læge eller lægevagten.

Du får taget en blodprøve (blodtype) inden indgrebet, hvis du/vi ikke kender din blodtype. Hvis du er Rhesus negativ og over 8 uger henne, så skal du have en indsprøjtning (kaldet Anti-D) indenfor 72 timer. Den forhindrer, at du i en fremtidig graviditet, danner antistoffer, hvis fosteret er rhesus positivt.

Har du brug for at læse mere om abort, så har Komiteen for Sundhedsoplysning udgivet et hæfte, som henvender sig til alle kvinder, der overvejer abort.

Hæftet indeholder oplysninger om dine rettigheder og valgmuligheder i forbindelse med valget mellem at gennemføre eller afbryde graviditeten.

HVIS DU OVERVEJER ABORT

(MATERIALE FRA SUNDHEDSSTYRELSEN)

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger.