

## Mindre operationer i huden

### Operation og biopsi

I lokalbedøvelse tages en vævsprøve omfattende alle tre hudlag, enten fra en del af forandringen eller ved at fjerne hele forandringen. Der afsluttes typisk med tråde, der skal fjernes efter 2-3 uger. Der sættes plaster på det behandlede område, som fjernes efter 1 døgn. Huden vaskes og nyt plaster påsættes. Selve biopsistedet holdes rent med god, daglig hygiejne med almindelig vand og sæbe, til det er helet op. Plaster skiftes hver 2.-3. dag.

Kommer der rødme, kan du i håndkøb købe Klorhexidicreme og bruge dette under plastret, der i dette tilfælde skal skiftes dagligt.

Med mindre du har fået andet at vide skal trådene fjernes ved egen læge efter 2 uger,

Du vil få svar på hudprøven i din eBoks.

Såret skal være helet helt op, inden du kan gå i svømmebad/havbade.

Når såret er helet, bør du det næste halve år dække arret med englehud (håndkøb) for at reducere ardannelsen.

### Curettage (afskrab af hudforandring og efterfølgende CO2-laserbehandling)

I lokalbedøvelse skrubes hudområdet af med en skarpske sammen med lidt rask hud.

Herefter behandles med CO2-laser, der fjerner yderligere en lille smule væv, standser blødning og steriliserer området.

Der påsættes plaster, som du kan tage af efter to dage. Herefter holdes såret rent med god, daglig hygiejne med vand og sæbe. Du bør dække såret med plaster, der som udgangspunkt skiftes hver anden dag.

Ved rødme og irritation, kan du i håndkøb købe Klorhexidicreme og bruge dette under plastret, der i dette tilfælde skal skiftes dagligt.

Såret vil være nogle få uger om at hele, og vil væske lidt, fordi der er tale om et brandsår.

Der vil komme et lille mærke/ar i det behandlede område. Beskyt med englehud (håndkøb) ved sollyseksponering for at optimere helingsforhold og nedsætte risiko for ar og pigmentdannelse.

Såret skal være helet helt op, inden du kan gå i svømmebad/havbade.

### Laseroperation (CO2-laserbehandling)

Der behandles med CO2-laser, der fjerner væv, standser blødning og steriliserer området.

Der påsættes plaster, som du kan tage af efter to dage. Herefter holdes såret rent med god, daglig hygiejne med vand og sæbe. Du bør dække såret med plaster, der som udgangspunkt skiftes hver anden dag.

Ved rødme og irritation, kan du i håndkøb købe Klorhexidicreme og bruge dette under plastret, der i dette tilfælde skal skiftes dagligt.

Ved overfladiske operationer bruges ofte ikke plaster istedet smøres med klorhexidincreme 2 gange dagligt til såret er lægt.

Såret vil være nogle få uger om at hele, og vil væske lidt, fordi der er tale om et brandsår.

Der vil komme et lille mærke/ar i det behandlede område. Beskyt med englehud (håndkøb) ved sollyseksponering for at optimere helingsforhold og nedsætte risiko for ar og pigmentdannelse.

Såret skal være helet helt op, inden du kan gå i svømmebad/havbade.