

---

## Udadrejet nedre øjenlåg (ectropion)

### Ectropion

Udad drejning af nedre øjenlåg skyldes en svækkelse af senerne i øjenlåget, hvorved øjenlåget drejer udad, eller hænger uden kontakt til øjeæblet.

Dette medfører irritation af øjnene, tåreflod og tilbagevendende infektioner.

### Behandling

Ofte har man forsøgt forskellige dråber og salver, som måske har hjulpet kortvarigt. Det er nødvendigt med en mindre operation for at løse problemet.

### Operation

Du får lokalbedøvende øjendråber og derefter en indsprøjtning med lokalbedøvelse i øjenlåget. Ved operationen strammes senerne i øjenlåget.

Efter operationen ser du en tråd sidde på hudsiden henover et plastikrør. Der kan opstå et mindre blåt øje, som følge af en blødning i øjenlåget. Dette forsvinder af sig selv. Du kan ikke selv køre hjem fra operationen.

### Efterbehandling

Du skal anvende øjendråber, som blandt andet indeholder antibiotika, 3 gange dagligt i 1 uge.

Den anden uge skal dråben kun anvendes til natten.

Recept ligger klar på medicin-serveren.

Det er normalt, at der er ømhed og lidt hævelse i ugen efter operationen.

### Kontrol

Tråden skal fjernes efter ca. 2 uger. Den fulde effekt af operationen opnås efter 6-8 uger.