

## Bedøvelsesformer

Som forberedelse til bedøvelsen vil der blive anlagt et tyndt plastikrør (et "drop") i en blodåre på hånden til indgift af væske og medicin. Der findes 2 hovedtyper af bedøvelse, fuld bedøvelse og lokal bedøvelse (disse kan også kombineres):

### Fuld bedøvelse

Foregår ved, at man indsprøjter sovemiddel gennem droppet, hvorefter du stille og roligt falder i søvn i løbet af ½ - 1 minut. En pumpe giver sovemedicin under operationen. Når pumpen stoppes, vågner du i løbet af ca. 8 minutter og er typisk så frisk, at du selv kan flytte dig fra operationslejet til sengen.

### Lokal bedøvelse

Foregår ved, at man indsprøjter lokalbedøvende væske omkring nerverne til den kropsdel, der skal opereres. Dette gør i reglen ikke mere ondt end at få taget en blodprøve. Vi benytter mange forskellige former for lokalbedøvelse.

### Rygbedøvelse (spinalbedøvelse)

Ved rygbedøvelse indsprøjtes lokalbedøvende væske imellem to ryghvirvler i lænderyggen. Underkroppen fra navlen og ned bliver følelsesløs. Bedøvelsen virker i 3-5 timer.

Benyttes kun lokal bedøvelse eller rygbedøvelse, er du vågen og smertebehandlet under operationen. Ofte kan du stadig mærke tryk eller berøring. Der vil være mulighed for at lytte til musik - medbring eventuelt selv musikafspiller.