

Cordarone / Amiodaron behandling

Hvad er Cordarone?

Cordarone er et præparat til behandling og forebyggelse af hjerterytmeforstyrrelser.

Hvordan virker Cordarone?

Cordarone virker ved at:

- hæmme de elektriske impulser i hjertet, så pulsen falder.
- stabilisere hjerterytmen.
- forebygge anfald af hurtig hjerterytme.

Hvordan doseres Cordarone?

Dosering af Cordarone tilpasses individuelt. Cordarone gives i så lav dosis som muligt.

Virkningen af Cordarone indtræder langsomt. Det kan vare fra uger op til 1-2 måneder, inden den fulde virkning er opnået.

Tilsvarende vil det vare nogle måneder før al medicin er ude af kroppen, når man holder op med at tage medicinen.

Almindeligvis vil man i starten af behandlingen få en større dosis for at "mætte" kroppen med medicinen.

Bivirkninger ved Cordarone-behandling

Langt de fleste tåler kortvarig Cordarone behandling godt. Som ved al anden medicin kan der dog opstå bivirkninger.

Risiko for bivirkninger øges almindeligvis med dosis størrelse og samlet behandlingstidslængde. Dvs. at man ofte kan fjerne bivirkninger ved at mindske dosis. Det er vigtigt at kende bivirkningerne, idet hurtig påvisning vil mindske generne - og nogle bivirkninger kan behandles medicinsk.

Hvilke bivirkninger ses ved Cordarone?

I starten af behandlingen kan Cordarone give kvalme, hovedpine og rysteture. Disse gener vil næsten altid være forbigående.

Hud

Cordarone øger hudens følsomhed for sollys og dermed risikoen for solskoldning. Dette fænomen ses hos de fleste.

Øjne

Næsten alle får mikroskopiske pigmentprikker på hornhinden under pupillen. Det er et harmløst fænomen, som sjældent påvirker synet.

Stofskifte

Cordarone kan påvirke skjoldbruskkirtlens hormon-produktion, oftest bliver stofskiftet for højt.

Symptomerne er øget svedtendens, uro, træthed, vægttab og øget kuldefornemmelse. Forstyrrelser i stofskiftet kan behandles medicinsk.

Hyppighed: Ca. 8-10%.

Lunger

Cordarone kan påvirke lungefunktionen og give generende hoste eller åndenød. Dette kan være en livstruende tilstand. De bør, selv ved lettere forværring i vejtrækningen, straks kontakte den behandlende speciallæge.

Hyppighed:2%.

Nervesystem

Cordarone kan påvirke nervesystemet og medføre gener som svimmelhed og føleforstyrrelser i arme og ben.

Hyppighed: Ca. 1%.

Hvilke forholdsregler skal du tage ved behandling med Cordarone?

Pga. den øgede risiko for solskoldning bør du undgå solbadning.

Ved ophold (arbejde eller gang) i solskin bør ansigtshuden beskyttes ved brug af bredskygget hat eller lignende. Huden på arme og ben beskyttes med skjorte, bluse og lange benklæder.

Generne kan du modvirke ved at bruge solcremer med høj beskyttelsesfaktor (faktor 30-50).

Hvem skal forny recepten?

Recepten på Cordarone skal skrives af en specialist i hjertesygdomme (kardiolog).

Cordarone og Marevan

Hvis du også får Marevan (blodfortyndende medicin) anbefales INR kontrol efter få dage og herefter ugentligt i en periode, fordi Cordarone forstærker effekten af Marevan.