

## MR-artrografi

MR betyder magnetisk resonans. Man foretager en MR-undersøgelse i en MR-scanner.

En MR-scanner er opbygget omkring en elektromagnet. Ved hjælp af denne samt radiobølger kan man lave billeder af kroppens forskellige dele. Teknikken er helt ufarlig, og man bruger ikke vævsbeskadigende stråler. Man kan blive skannet gentagne gange uden problemer.

Der er ikke nogen speciel forberedelse til undersøgelsen.

### Praktiske oplysninger

En MR-artrografi er en undersøgelse, der bruges til at undersøge instabilitet i hofte eller skulderled, hvor der kan være skader inde i leddet.

Vi skal have en henvisning fra din ortopædkirurg, der beskriver din problemstilling, inden du kan blive scannet.

Før undersøgelsen skal vi vide, om der er forhold, der kan forhindre din MR-undersøgelse.

Du kan **ikke** undersøges, hvis du har fået indsat en pacemaker eller er under 3 måneder henne i en graviditet.

Det er en god ide at have tøj på uden lynlåse og metalknapper, da du ikke må have dette på til undersøgelsen. Du må heller ikke have smykker på eller pung, mobiltelefon eller nøgler i lommen.

### Undersøgelsens forløb

Inden selve MR-scanningen skal der være kontraststof i leddet.

Du skal ligge på ryggen på et røntgenleje, hvorefter radiografen vasker huden af med sprit, lægger et sterilt papirstykke over leddet og herefter indsprøjter kontrasten ved hjælp af gennemlysning. Når kontrasten ligger som den skal, er du klar til at blive MR-scannet.

### Undersøgelsens varighed

10-15 min. til injektion og 20 min. til MR-scanningen.

Under skanningen hører du nogle bankelyde, der gentages afbrudt af pauser. Du er i kontakt med radiografen under undersøgelsen. Der er mulighed for at lytte til musik under scanningen.

Du får svar på skanningen fra din ortopædkirurg, når scanningen er beskrevet af radiologen.

### Efter undersøgelsen

Du må ikke bruge leddet unødigt på undersøgelsesdagen. Der kan være lette smerter i leddet de første to dage.

### Risici og bivirkninger

---

I sjældne tilfælde kan der komme infektionstegn i form af feber, rødme eller hævelse. Oplever du dette, skal du straks søge læge med henblik på behandling med penicillin.

Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte MR på Privathospitalet Mølholm.