

Information om botox

Hvad er cervikal dystoni

Cervikal dystoni er en overaktivitet i halsens muskler, som ofte medfører en tvangsdrejning af hovedet. Der findes forskellige former, som navngives efter i hvilken retning hoveddrejningen er (f.eks. torticollis). Tilstanden kan være smertefuld og ledsaget af hovedrysten.

Hvad er hemifaciale spasmer og blefarospasmer

Hemifaciale spasmer er sammentrækning af muskulaturen på ansigtets ene halvdel. Det involverer ofte øjenomgivelser og mundvig. Hos nogen medfører en lignende overaktivitet at øjnene lukkes i. Dette kaldes blefarospasmer og anfald kan udløses af f.eks. vind i ansigtet.

Hvad er Botulinumtoksin

Botulinumtoksin er et stof, der findes naturligt i en særlig type bakterier. Det anvendes til at få musklerne til at slappe af. Der sprøjtes ganske små mængder ind under huden i den muskel, som er angrebet. Det nedsætter de nervesignaler, som får musklerne til at trække sig sammen.

Formålet med behandlingen

Behandling med Botulinumtoksin har til formål at få de angrebne muskler til at slappe af. Hermed mindskes tvangsdrejning for hovedet eller sammentrækning af muskler i ansigt eller omkring øjnene. Formålet med behandlingen kan være f.eks. færre smerter, mindre hovedrysten eller forbedre evne til at holde øjnene åbne.

Undersøgelsen

Forundersøgelse og behandling varer ca. 40 min. afhængig af, hvor mange muskler der skal behandles. Inden undersøgelsen må du spise og drikke som sædvanligt. Det er en fordel ikke at have make-up eller cremer i de områder som skal behandles. Under behandlingen sidder du enten i din stol eller ligger på en briks.

Ved selve undersøgelsen vil lægen lave en såkaldt neurologisk undersøgelse for at klarlægge diagnose og hvilke muskler som skal behandles. Under selve behandlingen skannes dine muskler med ultralyd for præcist at kunne ramme de ønskede muskler. Ved behandling i ansigtet er denne metode ikke nødvendig. De stik der gives, svarer til følelsen af at få en indsprøjtning. De fleste oplever intet større ubehag ved behandlingen.

Bivirkninger til behandlingen

Der kan efter behandlingen opstå bivirkninger. Det kan være smerte eller blå mærker på indsprøjtningstedet, allergi eller overfølsomhed, kløe og hududslæt, træthedsfølelse, influenzalignende symptomer, almindelig svaghedsfølelse, skuldersmerter. Informer din læge om eventuelle bivirkninger.

Hvornår og hvor længe virker Botulinumtoksin?

Du kan forvente at se en forbedring inden for en uge efter indsprøjtningen. Virkningen er altid midlertidig. Ofte varer den ca. 3 måneder. Genbehandling planlægges efter behov, men må ikke foretages hyppigere end fremstillernes anbefalinger.

