
Minihysteroskopi (kikkertundersøgelse af livmoderhulen)

Du skal have foretaget en kikkertundersøgelse af livmoderhulen (minihysteroskopi).
Undersøgelsen foregår i vores ambulatorium og tager ca. 20-30 min.
Formålet med undersøgelsen er at inspicere og tage prøver fra livmoderhulen eller at fjerne polypper.

Undersøgelsen

Lægen indleder ofte med ultralydsscanning igennem skeden for at se livmoderens størrelse, placering etc. Herefter indføres en lille kikkert på ca. 5 mm igennem skeden og op i livmoderhulen. Der bliver skyllet med lunkent saltvand.
Når lægen har inspiceret livmoderhulen, tages der ofte små prøver. Skal der fjernes polypper, kan undersøgelsen vare lidt længere.



Smerter

Sædvanligvis er der kun lette smerter/ubehag i forbindelse med undersøgelsen. Dette opleves typisk når kikkerten skal passere livmoderhalsen eller hvis der skal tages prøver eller fjernes polypper. Smerterne kan minde om menstruationssmerter.
Derfor anbefaler vi at tage 1 g Panodil og 400 mg Ipren 1 time før undersøgelsen. Hvis det ikke er muligt, kan du få medicinen hos os i forbindelse med besøget.
Det kan være nødvendigt at anlægge lokalbedøvelse i livmoderhalsen hvis livmoderhalskanalen er snæver.

Efter undersøgelsen

Du aftaler med lægen, hvordan du får svar på prøverne, og om der er behov for yderligere kontrol. Der er ikke behov for sygemelding og du kan selv køre hjem fra undersøgelsen.

Det er normalt at have lette smerter i op til en uge efter undersøgelsen samt let blødning og øget mængde udflåd helt frem til næste menstruation.

Komplikationer

Komplikationer til denne undersøgelse er sjældne (<1%).
Der er en lille risiko for infektion efter indgrebet, dette behandles med antibiotika.
I meget sjældne tilfælde kan der komme et lille hul i livmoderen ved indgrebet. Oftest er det uproblematisk, men i enkelte tilfælde kan det blive nødvendigt at foretage en kikkertoperation (laparoskopi) igennem bugvæggen.

Hvis du oplever følgende symptomer, bedes du kontakte os

- Kraftig blødning
- Ildelugtende udflåd
- Kraftige smerter
- Feber