

Regler for din vanlige medicin før operationen

I forbindelse med operationen skal du tage din medicin som vanligt.

Der er dog følgende undtagelser:

Acetylsalicylsyre (f.eks. Hjerdyl®, Hjertermagnyl®, Kodimagnyl®, Treo®)

Stoppes 3 dage før operationen og genoptages dagen efter operationen.

OBS: Hvis du tidligere har haft blodprop, gennemgået ballonudvidelse eller fået indlagt stent i hjertet, gælder særlige regler, og du må kun stoppe med Acetylsalicylsyre, når det er aftalt med lægen.

Andre typer af blodfortyndende medicin

Du skal aftale med lægen om der skal holdes pause med blodfortyndende medicin op til operationen.

NSAID (smertestillende "gigtmedicin")*

Stoppes 5 dage før operationen – dog 14 dage for tenoxicam (Tilcotil®).

Eksempler på smertestillende "gigtmedicin" der skal stoppes 5 dage før operationen: Arcoxia, Bonyl, Brufen, Burrana, Celebra, Celebrex, Confortid, Diclodan, Diclofenac, Diclon, Dynastat, Eox, Ibumax, Ibumetin, Ibuprofen, Ibustar, Ipren, Kettesse, Meloxicam, Migea, Modifenac, Naproxyn, Nurofen, Relifex, Seractiv, Surgamyl, Tilcitin, Todalac, Vimovo, Voltaren, Xefo, Arthotec.

Sukkersyge-medicin

Du skal tage din sukkersyge-medicin inden operationen som anført herunder:

- SGLT2-hæmmere (Forxiga, Jardiance, Edistride, Synjardy, Xigduo, Vokaname): Udelades 3 dage før operationen.
- Langtidsvirkende insulin (Semglee, Toujeo, Lantus, Tresiba, Absaglar, Levemir, Xultophy Insulatard, Humulin NPH): Tages som vanligt.
- Korttidsvirkende insulin (Actrapid, Humulin Regular, Apidra, Fiasp, Novorapid, Insulin Aspart): Udelades i fasteperioden.
- Øvrig medicin for sukkersyge: Udelades på operationsdagen.

Hvis du får insulin kombinationspræparater (Ryzodeg, Humalog Mix, Mixtard, NovoMix) gælder særlige regler afhængigt af hvornår på dagen du skal opereres - aftales med lægen

Hvis du har insulinpumpe bedes du:

- Skifte infusionsæt senest dagen før operationen, med henblik på at sikre, at nålen er velfungerende.
- Sørge for at der er rigeligt insulin i pumpens reservoir, så den ikke løber tør på OP-dagen.
- Medbringe et ekstra infusionsæt og pumpeinsulin.

Naturmedicin, kosttilskud herunder fiskeolier

Stoppes 7 dage før operationen og genoptages dagen efter operationen.

Naltrexon

Stoppes 3 dage før operationen og genoptages 3 dage efter ophør med morfinlignende medicin efter

operationen.