

Regler for din vanlige medicin før operationen

I forbindelse med operationen, skal du tage din medicin som vanligt.

Der er dog følgende undtagelser:

Acetylsalicylsyre (f.eks. Hjerdyt®, Hjertemagnyl®, Kodimagnyl®, Treo®)

Stoppes 3-5 dage før operationen og genoptages dagen efter operationen.

OBS: Hvis du tidligere har haft blodprop, gennemgået ballonudvidelse eller fået indlagt stent i hjertet, gælder særlige regler, og du må kun stoppe med Acetylsalicylsyre, når det er aftalt med læge.

Andre typer af blodfortyndende medicin

Det bliver ved konsultationen før operationen aftalt hvor mange dages pause med blodfortyndende medicin du skal holde op til operationen.

Sukkersyge-medicin

Du skal tage din sukkersyge-medicin inden operationen som anført herunder:

- SGLT2-hæmmere (Forxiga, Jardiance, Edistride, Synjardy, Xigduo, Vokaname): Udelades 3 dage før operationen.
- Langtidsvirkende insulin (Semglee, Toujeo, Lantus, Tresiba, Absaglar, Levemir, Xultophy Insulatard, Humulin NPH): Tages som vanligt.
- Korttidsvirkende insulin (Actrapid, Humulin Regular, Apidra, Fiasp, Novorapid, Insulin Aspart): Udelades i fasteperioden.
- Øvrig medicin for sukkersyge: Udelades på operationsdagen.

Hvis du får insulin kombinationspræparater (Ryzodeg, Humalog Mix, Mixtard, NovoMix) gælder særlige regler, afhængigt af hvornår på dagen du skal opereres - aftales med lægen

Hvis du har insulinpumpe bedes du:

- Skifte infusionssæt senest dagen før operationen, med henblik på at sikre, at nålen er velfungerende.
- Sørge for at der er rigeligt insulin i pumpens reservoir, så den ikke løber tør på OP-dagen.
- Medbringe et ekstra infusionssæt og pumpeinsulin.

Naltrexon

Stoppes 3 dage før operationen og genoptages 3 dage efter ophør med morfinlignende medicin efter operationen.