

Regler for din vanlige medicin før operationen

I forbindelse med operationen skal du tage din medicin som vanligt. Dette gælder også blodpropforebyggende medicin som acetylsalicylsyre (f.eks. Hjerdyl®, Hjertemagnyl®, Kodimagnyl®, Treo®).

Der er dog følgende undtagelser:

Anden blodpropforebyggende ("blodfortyndende") medicin

Det skal aftales med kirurgen om der skal holdes pause med medicinen før operationen.

Sukkersyge-medicin

Du skal tage din sukkersyge-medicin inden operationen som anført herunder:

- SGLT2-hæmmere (Forxiga, Jardiance, Edistride, Synjardy, Xigduo, Vokanase): Udelades 3 dage før operationen.
- Langtidsvirkende insulin (Semglee, Toujeo, Lantus, Tresiba, Absaglar, Levemir, Xultophy Insulatard, Humulin NPH): Tages som vanligt.
- Korttidsvirkende insulin (Actrapid, Humulin Regular, Apidra, Fiasp, Novorapid, Insulin Aspart): Udelades i fasteperioden.
- Øvrig medicin for sukkersyge: Udelades på operationsdagen.

Hvis du får insulin kombinationspræparater (Ryzodeg, Humalog Mix, Mixtard, NovoMix) gælder særlige regler afhængigt af hvornår på dagen du skal opereres - aftales med lægen

Hvis du har insulinpumpe bedes du:

- Skifte infusionssæt senest dagen før operationen, med henblik på at sikre, at nålen er velfungerende.
- Sørge for at der er rigeligt insulin i pumpens reservoir, så den ikke løber tør på OP-dagen.
- Medbringe et ekstra infusionssæt og pumpeinsulin.

Naturmedicin, kosttilskud herunder fiskeolier

Stoppes 7 dage før operationen og genoptages dagen efter operationen.

Naltrexon

Stoppes 3 dage før operationen og genoptages 3 dage efter ophør med morfinlignende medicin efter operationen.