

Indadrejet nedre øjenlåg (entropion)

Indad drejning af nedre øjenlåg skyldes en spasme af musklerne i øjenlåget, hvorved øjenvipperne fejer imod øjeæblet.

Dette medfører rødme, irritation af øjnene og tilbagevendende infektioner.

Behandling

Ofte har man forsøgt forskellige dråber og salver, som måske har hjulpet kortvarigt. Det er nødvendigt med en mindre operation.

Operation

Du får lokal bedøvende øjendråber, og derefter en indsprøjtning med lokalbedøvelse i øjenlåget. Ved operationen slækkes de stramme muskel-fibre. Efter operationen ser du en tråd sidde på hudsiden. Der kan opstå et mindre blåt øje, som følge af en blødning i øjenlåget. Dette forsvinder af sig selv. Du kan ikke selv køre hjem fra operationen.

Efterbehandling

Du skal anvende øjendråber, som bl.a. indeholder antibiotika: 1 dråbe x 4 i 1 uge, herefter 1 dråbe til natten i 1 uge.

Recept ligger klar på medicin serveren.

Det er normalt, at der er ømhed og lidt hævelse i ugen efter operationen.

Kontrol

Tråden skal fjernes efter ca. 2 uger. Den fulde effekt af operationen opnås efter 6–8 uger.