



## Hjertebehandling - Regler for din vanlige medicin før operationen

Du skal følge den patientinformation, du har modtaget i forbindelse med din indkaldelse til undersøgelse/behandling.

For sukkersyge-medicin gælder dog følgende:

- Langtidsvirkende insulin (Semglee, Toujeo, Lantus, Tresiba, Absaglar, Levemir, Xultophy Insulatard, Humulin NPH): Tages som vanligt.
- Korttidsvirkende insulin (Actrapid, Humulin Regular, Apidra, Fiasp, Novorapid, Insulin Aspart): Udelades i fasteperioden.
- Øvrig medicin for sukkersyge: Udelades på operationsdagens morgen.

Hvis du får insulin kombinationspræparater (Ryzodeg, Humalog Mix, Mixtard, NovoMix) gælder særlige regler afhængigt af hvornår på dagen du skal opereres - aftales med lægen

OBS: Hvis du skal have undersøgt kranspulsårerne og er i behandling med Metformin, skal du holde pause med Metformin 2 døgn før behandlingen.

Hvis du har insulinpumpe bedes du:

- Skifte infusionssæt senest dagen før operationen, med henblik på at sikre, at nålen er velfungerende.
- Sørge for at der er rigeligt insulin i pumpens reservoir, så den ikke løber tør på OP-dagen.
- Medbringe et ekstra infusionssæt og pumpeinsulin.