

## Regler for din vanlige medicin før operationen

I forbindelse med operationen skal du tage din medicin som vanligt. Dette gælder også blodpropforebyggende medicin som acetylsalicylsyre (f.eks. Hjerdyl®, Hjertemagnyl®, Kodimagnyl®, Treo®).

Der er dog følgende undtagelser:

### **Anden blodpropforebyggende ("blodfortyndende") medicin**

Det skal aftales med kirurgen om der skal holdes pause med medicinen før operationen.

### **Sukkersyge-medicin**

Du skal tage din sukkersyge-medicin som anført herunder:

SGLT2-hæmmere	Udelad 3 dage før operationsdagen	Ex. Forxiga, Jardiance, Edistride, Synjardy, Xigduo, Vokanave
Langtidsvirkende insulin	Tag som vanligt	Ex. Semglee, Toujeo, Lantus, Tresiba, Absaglar, Levemir, Xultophy Insulatard, Humulin NPH)
Måltidsinsulin	Udelad i fasteperioden	Ex. Actrapid, Humulin Regular, Apidra, Fiasp, Novorapid, Insulin Aspart
Øvrig medicin for sukkersyge inkl. kombinationsinsulin	Udelad på operationsdagen	Kombinations-insulin: Ex. Ryzodeg, Humalog Mix, Mixtard, NovoMix

### **Naturmedicin, kosttilskud herunder fiskeolier**

Stoppes 7 dage før operationen og genoptages dagen efter operationen.

### **Naltrexon**

Stoppes 2 dage før operationen og genoptages 2 dage efter ophør med morfinlignende medicin efter operationen.