

Regler for din vanlige medicin før operationen

I forbindelse med operationen skal du tage din medicin som vanligt.

Der er dog følgende undtagelser:

Acetylsalicylsyre (f.eks. Hjerdyl®, Hjertemagnyl®, Kodimagnyl®, Treo®)

Stoppes 7 dage før operationen og genoptages dagen efter operationen. Der er følgende undtagelser:

OBS: Hvis du tidligere har haft blodprop, gennemgået ballonudvidelse eller fået indlagt stent i hjertet, gælder særlige regler, og du må kun stoppe med Acetylsalicylsyre, når det er aftalt med lægen.

Andre typer af blodfortyndende medicin

Du skal aftale med lægen der skal operere dig om der skal holdes pause med blodfortyndende medicin op til operationen.

NSAID (smertestillende "gigtmedicin")*

Stoppes 5 dage før operationen – dog 14 dage for piroxicam (Felden®, Pirom®), phenylbutazon (Fenylbutazon®) og tenoxicam (Tenoxicam®, Tilcotil®).

*, F.eks. Arcoxia, Bonyl, Brufen, Burrana, Celebra, Celebrex, Confortid, Diclodan, Diclofenac, Diclon, Dynastat, Eox, Ibumax, Ibumetin, Ibuprofen, Ibustar, Ipren, Ketesse, Meloxicam, Migea, Modifenac, Naproxyn, Nurofen, Relifex, Seractiv, Surgamyl, Tilcitin, Todalac, Vimovo, Voltaren, Xefo, Arthotec

Sukkersyge-medicin

Du skal tage din sukkersyge-medicin som anført herunder:

SGLT2-hæmmere	Udelad 3 dage før operationsdagen	Ex. Forxiga, Jardiance, Edistride, Synjardy, Xigduo, Vokanave
Langtidsvirkende insulin	Tag som vanligt	Ex. Semglee, Toujeo, Lantus, Tresiba, Absaglar, Levemir, Xultophy Insulatard, Humulin NPH)
Måltidsinsulin	Udelad i fasteperioden	Ex. Actrapid, Humulin Regular, Apidra, Fiasp, Novorapid, Insulin Aspart
Øvrig medicin for sukkersyge inkl. kombinationsinsulin	Udelad på operationsdagen	Kombinations-insulin: Ex. Ryzodeg, Humalog Mix, Mixtard, NovoMix

Naturmedicin, kosttilskud herunder fiskeolier

Stoppes 14 dage før operationen og genoptages dagen efter operationen.

Naltrexon

Stoppes 2 dage før operationen og genoptages 2 dage efter ophør med morfinlignende medicin efter operationen.