

Behandling for efterstær

Efterstær er en godartet tilstand, som kan opstå kortere eller længere tid efter en linseudskiftning eller operation for grå stær (1 måned til flere år). Generne minder om grå stær: Sløring af synet og eventuelt lysfølsomhed. Årsagen er, at der er opstået en mathed af linsens naturlige kapsel, som efterlades ved operationen til støtte for den nye lille kunstige linse. Nye briller hjælper ikke.

Efterstær opstår hos ca. 20%.

Behandling

Efterstær behandles med laser-lys (YAG-laser), som laver en fin åbning i den uklare hinde. Med mindre der er sket forandringer i andre dele af øjet, vil synet igen blive lige så godt, som det var efter operationen. Behandlingen opleves som små lysglimt. Den er smertefri og varer under 10 minutter. Inden behandlingen dryppes øjet med pupil-udvidende dråber.

Allerede samme dag kan du mærke at synet bedres, men da øjet har fået pupil-udvidende dråber, er du meget lysfølsom i nogle timer herefter.

I ugerne efter behandlingen er det almindeligt at se svævende uklarheder, som efterhånden vil forsvinde.

Efterbehandling

Det er meget sjældent nødvendigt med supplerende behandling. Efterstæren kan ikke komme igen.

Såfremt du skal anvende dråber, ligger en recept klar på medicinserveren på apoteket.

Kontrol

Er sjældent nødvendigt.

Komplikationer

Det er yderst sjældent der opstår komplikationer efter behandling for efterstær. Der er en lille risiko for at få hævelse i nethinden og nethindeløsning. Hvis du oplever nedenstående, skal du kontakte øjenlægen:

- Smerter
- Rødt øje

Symptomer på nethindeløsning:

- Lysglimt, som kan ses både med åbent og lukket øje.
- Nyopståede og mange mørke svævende uklarheder.
- En skygge, som ikke flytter sig, eventuelt som et gardin.

Symptomer på hævelse af nethinden:

- Læsning bliver besværligt og ting, midt i synsfeltet, ses forvrænget.

Såfremt dette opstår skal du kontakte Privathospitalet Mølholm eller en øjenlæge.

Vi træffes på telefon [76 42 74 24](tel:76427424).